

Orden de 15 de enero de 2016 por la que se convoca el turno de ascenso para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

D.O.E. número 12, de 20 de enero de 2016

TRIBUNAL Nº 23

TURNO DE ASCENSO

GRUPO IV

CATEGORÍA PASTOR

PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST



Mérida, 30 de junio de 2016

- 1.- ¿Qué es el redileo?
 - a. Una característica de la mejora genética en los cruces industriales.
 - b. Un sistema de alimentación utilizado en ganado porcino.
 - c. Una técnica que consiste en hacer pernoctar al ganado ovino en corrales de cancelas.
 - d. Un sistema utilizado en las explotaciones para inmovilizar al ganado vacuno.

- 2.- ¿Qué tipo de sistema digestivo tiene el ganado vacuno?
 - a. Herbívoro poligástrico.
 - b. Herbívoro monogástrico.
 - c. Omnívoro poligástrico.
 - d. Omnívoro monogástrico.

- 3.- Según el art. 5.2 del Real Decreto 1980/1998 que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, las marcas auriculares llevan impreso el escudo de:
 - a. España.
 - b. Extremadura.
 - c. Comunidad Europea.
 - d. Provincia.

- 4.- En la explotación productiva de la raza bovina *Charolesa* se valora su:
 - a. Buena robustez y aprovechamiento forrajero.
 - b. Bajo índice de transformación.
 - c. Buena aptitud lechera.
 - d. Mal comportamiento en cebadero.

- 5.- Es una variedad de cerdo ibérico:
 - a. Duroc.
 - b. Lampiño.
 - c. Landrace.
 - d. Chato Murciano.

- 6.- La alimentación "ad libitum" consiste en:
 - a. Darle a los animales tanta comida como quieran.
 - b. Recortar la cantidad de comida para provocar el celo.
 - c. Alimentar solamente con concentrados.
 - d. Alimentar únicamente con alimentos forrajeros.

- 7.- El volumen de la ración para un animal depende de:
 - a. Su contenido en materia seca.
 - b. Del peso de los alimentos que la integran.
 - c. Su contenido en vitaminas.
 - d. La temperatura ambiental.

- 8.- Una mala práctica a la hora de realizar un esquila es:
 - a. Que el animal esté recién comido.
 - b. Tratar las heridas de corte por esquila para evitar infecciones.
 - c. Evitar que el vellón de los animales esté humedecido.
 - d. Almacenar la lana en sacas y guardarlas en sitio ventilado y seco.



- 9.- Qué producto protege la Denominación de Origen "Dehesa de Extremadura":
- Queso.
 - Aceite.
 - Jamón.
 - Vino.
- 10.- El primer paso a seguir en un plan de mejoras de la cabaña ganadera será...
- Desarrollar líneas maternas y paternas por separado.
 - Comprobar la heredabilidad de los rasgos a seleccionar.
 - Tener un sistema de cruzamiento.
 - Definir los rasgos a seleccionar.
11. En el sistema de explotación mixto:
- Se da básicamente el pastoreo.
 - El ganado no está estabulado, pasta libremente.
 - Se utiliza principalmente el cruce industrial.
 - Se combina pastoreo y estabulación.
- 12.- ¿Qué especie animal es la más usada en el pastoreo de majadales?
- El ganado ovino.
 - El ganado vacuno.
 - Conviene alternar ganado ovino con vacuno.
 - El ganado porcino.
- 13.- En cuanto a la temperatura de la leche artificial a suministrar a los corderos:
- Debe suministrarse a una temperatura semejante a la corporal, entre 70-80° C.
 - Debe suministrarse a una temperatura semejante a la corporal, entre 90-100° C.
 - Debe suministrarse a una temperatura semejante a la corporal, entre 20-30° C.
 - Debe suministrarse a una temperatura semejante a la corporal, entre 35-40° C.
- 14.- Con respecto a los calostros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- Tiene un bajo contenido de inmunoglobulinas.
 - Se produce a la semana del parto.
 - Tiene poca concentración de lactosa.
 - Se mantienen durante toda la lactancia.
- 15.- El ciclo estral de una vaca tiene una duración media aproximada de:
- 60 días.
 - 40 días.
 - 100 días.
 - 21 días.
- 16.- Las especies anuales herbáceas que forman la mayor parte de los pastos de secano de Extremadura se desarrollan durante:
- Otoño, invierno y primavera.
 - Otoño y primavera.
 - Primavera y verano.
 - Otoño, invierno, primavera y verano.



- 17.- Que características cumple la raza bovina *blanca cacereña*:
- Alto rendimiento cárnico.
 - Raza en peligro de extinción.
 - Coloración de la capa negra uniforme.
 - De perfil convexo.
- 18.- Alojjar a los verracos en edificios cerrados es:
- Una solución poco frecuente en explotaciones porcinas intensivas.
 - Una solución donde el suelo es barato.
 - Una solución muy frecuente en explotaciones porcinas intensivas.
 - Una solución para explotaciones ovinas, nunca porcinas.
- 19.- El objetivo de una fertilización está dirigido al fomento de especies herbáceas de la familia:
- Leguminosas.
 - Compuestas.
 - Gramíneas.
 - Crucíferas.
- 20.- Para limpiar unas instalaciones ganaderas es conveniente una vez al año utilizar agua a presión:
- Después de retirar el estiércol y antes de la desinfección.
 - Antes de la retirada del estiércol.
 - Después de retirar el estiércol y desinfectar.
 - Las instalaciones ganaderas no necesitan limpieza y desinfección.
- 21.- ¿Qué comarca veterinaria de Extremadura cuenta con mayor número de cerdos?
- Castuera.
 - Trujillo.
 - Valencia de Alcántara.
 - Zafra.
- 22.- Para cada denominación de origen o indicación geográfica existirá un órgano de gestión, con la naturaleza de corporación de derecho público, que, sin perjuicio de lo establecido en normas básicas estatales, se denominará:
- Consejo de Gobierno.
 - Consejo Regulador.
 - Centro Directivo.
 - Consejo de Área.
- 23.- ¿Con qué tipo de leche se realiza el queso perteneciente a la Denominación de Origen Queso de los Ibores?
- Con leche de oveja merina.
 - Con leche de cabra y leche de oveja.
 - Con leche de cabra.
 - Con leche de cabra y leche de vaca.



- 24.- De los siguientes estados de la cabra, ¿en cuál se reduce la capacidad de ingestión?
- En cubrición.
 - Al principio de la gestación.
 - Cuando el cabrito alcanza los 10 kg.
 - Al final de la gestación.
- 25.- Después de la fase de recria, el periodo de cebo en los lechones comienza, aproximadamente, cuando alcanzan un peso:
- Entre 1 y 1,5 Kg.
 - Entre 5 y 7 Kg.
 - Entre 7 y 10 Kg.
 - Superior a los 15 Kg.
- 26.- Los piensos compuestos formulados para ser combinados con ciertas materias primas se denominan:
- Completos.
 - Complementarios.
 - Terminantes.
 - Prestarter.
- 27.- La composición de la leche artificial para corderos:
- A largo plazo retrasa su crecimiento.
 - Tiene escaso contenido de proteínas.
 - Reduce el aporte en lípidos y, por tanto, un menor engrasamiento de los corderos.
 - Tiene muy alto contenido de lactosa.
- 28.- ¿Cuánto dura el celo en la cabra?
- 1 día.
 - 2 días.
 - 3 días.
 - 4 días.
- 29.- La mayor concentración de ganado vacuno en Extremadura se da en la comarca veterinaria de:
- Plasencia.
 - Castuera.
 - Don Benito.
 - Azuaga.
- 30.- La provincia española con mayor número de cerdas ibéricas es:
- Salamanca.
 - Cáceres.
 - Badajoz.
 - Huelva.
- 31.- En la producción de leche de las cerdas:
- El agotamiento lácteo se produce en torno a las ocho semanas después del parto.
 - La producción lechera sigue una línea descendente hasta la 3-4 semanas después del parto.
 - El destete de los lechones se produce a partir de los 100 días.
 - La producción de leche se reduce con las mamadas que hacen los lechones.



- 32.- La mejora de pastos ...
- Prolonga el periodo de aprovechamiento.
 - Reduce la producción en épocas críticas.
 - Desequilibra las diferencias estacionales.
 - Reduce la biodiversidad.
- 33.- El intervalo de tiempo existente desde el comienzo de un período de celo hasta el comienzo del siguiente se denomina:
- Ciclo estral.
 - Celo.
 - Momento de ovocitación respecto al celo.
 - Anoestro estacionario.
- 34.- Es un inconveniente del sistema de producción extensivo:
- La corta duración de los ciclos productivos.
 - La facilidad para encontrar mano de obra.
 - Los problemas higiénicos-sanitarios.
 - La mejora de la fertilización del terreno.
- 35.- El Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Extremadura" establece que los terneros permanecerán lactando junto a sus madres hasta cumplir la edad mínima de:
- Tres meses.
 - Cinco meses.
 - Un año.
 - No establece periodo mínimo de lactancia.
- 36.- Es una raza de la especie ovina:
- Morucha.
 - Lacaune.
 - Florida.
 - Celta.
- 37.- En el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, figura como una raza de ovino la:
- Bermeya.
 - Retinta.
 - Talaverana.
 - Frisona.
- 38.- ¿Qué Comunidad Autónoma cuenta con mayor concentración de ganado caprino?
- Extremadura.
 - Castilla la Mancha.
 - Andalucía.
 - Galicia.
- 39.- En cubrición, de media, ¿cuánto tiempo deben estar los moruecos con las hembras?
- 10 días.
 - 25 días.
 - 30 días.
 - 45 días.



- 40.- Dejar el rabo sin cortar en el ganado ovino implica:
- Dificultades de la cópula en las hembras.
 - Facilita las labores de ordeño.
 - Favorece el desplazamiento de los animales.
 - Mejora la estética de los animales.
- 41.- En Extremadura, la época más adecuada para mantener una carga ganadera intensa es:
- Durante el invierno hasta el comienzo de la floración.
 - Al principio del otoño. (octubre-noviembre)
 - Al inicio del periodo de floración en primavera.
 - En plena floración, a mediados de primavera. (abril-mayo)
- 42.- En una explotación extensiva de cerdo ibérico:
- No hay relación con el medio ambiente.
 - La relación entre el animal y el medio ambiente es completa.
 - Esta raza tiene su razón de ser fuera de la dehesa.
 - Esta especie no aprovecha los recursos que le ofrece el ecosistema.
- 43.- El redileo óptimo se realiza con una densidad aproximada de:
- En el redileo no influye el número de animales.
 - Cien animales por hectárea.
 - Cincuenta animales por hectárea.
 - Un animal por metro cuadrado.
- 44.- Salvo excepciones y según la normativa vigente, todo el ganado caprino nacido en España debe identificarse:
- Sólo mediante el crotal auricular con el número de explotación.
 - Solamente con el bolo electrónico.
 - Sólo con crotal si este es electrónico.
 - Mediante crotal auricular y un identificador electrónico.
- 45.- En una explotación ganadera, ¿cuál es la forma más común de selección animal?
- La selección por macho.
 - La selección por genotipo.
 - La selección por hembra.
 - La selección por fenotipo.
- 46.- Para mejorar sus características productivas y reproductivas, ¿cuál de las siguientes razas es más común en el cruce con el porcino ibérico?
- Landrace.
 - Large-White.
 - Pietrain
 - Duroc.
- 47.- Para la corrección de un suelo salino en una pradera, el sistema de riego más eficaz es:
- Por aspersión.
 - Por riego localizado.
 - A surco.
 - Por goteo.



- 48.- Además de la estimulación directa del pezón provocada por la succión, ¿qué otro estímulo es capaz de generar el reflejo de la eyección?
- Sólo puede producirlo la succión.
 - A través de estímulos sensoriales auditivos (como por ejemplo, el ruido de los cubos a la hora del ordeño).
 - Situaciones de estrés.
 - Ambientes fríos.
- 49.- Las principales razas caprinas utilizadas en la dehesa de Extremadura son:
- Retinta, Verata y Majorera.
 - Retinta, Serrana y Palmera.
 - Retinta, Majorera y Murciana.
 - Retinta, Verata y Serrana.
- 50.- Una de las causas por la que se acude a la lactancia artificial de corderos es:
- La disminución de la prolificidad.
 - El aumento de la prolificidad en las explotaciones ganaderas.
 - Porque en ovejas explotadas para la producción de leche, la leche materna es de escaso valor nutritivo y económico.
 - Porque la leche "reemplazante" es de mayor valor nutritivo que la leche materna.
- 51.- ¿Cuál de los siguientes cereales es el más utilizado para la producción forrajera?
- Trigo.
 - Cebada.
 - Avena.
 - Centeno.
- 52.- En el cruzamiento industrial las cualidades cárnicas las aporta generalmente...
- El macho.
 - La hembra.
 - Indistintamente el macho y la hembra.
 - En el cruce industrial no se buscan cualidades cárnicas.
- 53.- Para obtener un buen heno de cereal, ¿en qué estado debe segarse?
- Antes de formarse el grano.
 - Con el grano bien formado.
 - Cuando el grano se encuentra en estado lechoso.
 - Con la planta en estado seco.
- 54.- En general, la capacidad de ingesta para una cabra de 60 Kg. oscila entre:
- 8 y 12,5 Kg.
 - 1,2 y 3 Kg.
 - 15 y 20 Kg.
 - 20 y 25 Kg.
- 55.- Según el censo definitivo de noviembre de 2014 publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el número de animales censados en la provincia de Cáceres es superior a los de la provincia de Badajoz en las especies:
- Bovino y porcino.
 - Ovino y caprino.
 - Bovino y caprino.
 - Bovino y ovino.



- 56.- Atendiendo a su aparato digestivo, ¿qué tipo de animal es el cerdo?
- Poligástrico y omnívoro.
 - Monogástrico y omnívoro.
 - Detritívoros y forrajero.
 - Poligástrico estacional.
- 57.- Que raza de la especie ovina es más abundante en Extremadura:
- Castellana.
 - Churra.
 - Merina.
 - Talaverana.
- 58.- ¿Cuál de las siguientes características es propia de los majadales?
- Produce poca cantidad de forraje por el exceso de materia orgánica.
 - Produce pastos con gran cobertura y alta calidad para el pastoreo.
 - Los majadales son terrenos marginales y pedregosos.
 - Produce plantas y pastos altos y propios para el ensilado.
- 59.- Las marcas auriculares de los animales de la especie bovina contendrán un código de identificación que estará compuesto por un código de barras y por los siguientes caracteres:
- Las letras EX seguidas de 12 caracteres numéricos.
 - Las letras ES seguidas de 14 caracteres numéricos.
 - Las letras CE seguidas de 12 caracteres numéricos.
 - Las letras ES seguidas de 12 caracteres numéricos.
- 60.- Proporcionalmente, la capacidad del aparato digestivo del ganado vacuno respecto al ganado porcino es:
- 4 veces mayor.
 - Igual.
 - 10 veces mayor.
 - 2 veces menor.

Preguntas adicionales

- 1.- Una característica productiva del cerdo ibérico, comparada con las razas porcinas comerciales más extendidas, es:
- Menor deposición grasa.
 - Menor contenido de ácidos grasos monoinsaturados.
 - Mayor rendimiento en magro.
 - Mayor porcentaje de grasa intramuscular.
- 2.- Según establece el Reglamento que regula su Denominación de Origen, el “Queso de la Serena” al término de su maduración presenta un peso de:
- 750 gramos a 2 kilogramos.
 - 500 gramos a 3 kilogramos.
 - 250 gramos a 500 gramos.
 - Superior a 2 kilogramos.



- 3.- Una de las características del queso Denominación de Origen "Queso de la Serena" es:
- No aporta vitaminas A, D y E.
 - Para obtenerlo la leche se cuaja a temperaturas altas, de entre 65° y 80° C.
 - Este queso no es Denominación de Origen de Extremadura.
 - Aporta minerales como calcio, fósforo y zinc.
- 4.- La prolificidad media de un animal se refiere a...
- El número de animales que nacen durante un año.
 - El número de animales vivos que nacen por madre en un año.
 - El número de animales que nacen por parto y año.
 - El número de animales muertos que nacen por parto en un año.
- 5.- El método de cruzamiento industrial se caracteriza por...
- El aumento del carácter maternal de la descendencia.
 - Porque no persigue mejora genética de la descendencia.
 - Aumentar el índice de fecundidad de la descendencia.
 - Refrescar la sangre de la descendencia.
- 6.- La producción intensiva de porcino en España se realiza primordialmente:
- Con razas puras.
 - Con animales cruzados.
 - Sólo se utilizan hembras.
 - Todos los animales provienen de esquemas de cruzamiento planificado.
- 7.- Con la producción de cerdo blanco en extensivo se persigue:
- Rentabilidad agraria y bienestar animal.
 - Sólo rentabilidad agraria.
 - Sólo bienestar animal.
 - Establecer una explotación ganadera sobre terreno muy productivo.
- 8.- ¿Cuál de los siguientes alimentos es el que mayor número de defensas aporta al lechón?
- Los piensos medicamentados.
 - La leche artificial.
 - El calostro.
 - La leche materna.
- 9.- ¿En qué momento es más importante incrementar la ingesta de alimentos en los rumiantes?
- En la cubrición.
 - Al comienzo de la lactación.
 - En la última fase de la gestación.
 - Al cumplir un año de vida.
- 10.- A las hembras que gestan un solo feto se les llama:
- Monogestáticas.
 - Politocas.
 - Monotildáticas.
 - Monotocas.

