



JUNTA DE EXTREMADURA  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
y Medio Natural  
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Servicio de Sanidad Vegetal  
Dirección Programas P. Integrada  
Diagnósticos y Avisos Agrícolas  
Estación de Avisos Agrícolas.

AÑO: LIV

BOLETÍN N.º: 18

FECHA: 21/10/2026

Boletín electrónico

## OLIVO

### MOSCA DEL OLIVO (*Bactrocera oleae*)



*Galería y larva de mosca en aceituna*



*Aceituna con picada*

Las altas temperaturas de la larga ola de calor de agosto y septiembre unidas a la baja humedad relativa han propiciado unas condiciones que no han sido favorables para esta plaga.

Según los conteos realizados por técnicos de las ATESVES, la incidencia de la plaga, hasta el momento, está siendo baja en las distintas comarcas olivareras de la región, pero en líneas generales, la bajada de temperaturas y las ligeras lluvias de estos últimos días de octubre están favoreciendo su desarrollo, aumentando tanto los niveles de capturas de adultos como el índice de aceitunas picadas en la mayoría de las zonas olivareras, sobre todo en la Comarca de Tentudía.

Se recomienda continuar con la vigilancia de la plaga, y seguir las recomendaciones de tratamientos realizadas por los técnicos de las ATESVES más próximas, extremando la precaución de respetar los plazos de seguridad de las materias activas aplicadas.

**Productos:** Acetamiprid, Beauveria bassiana, caolín, cipermetrín, cyantraniliprol, deltametrín, flupiradifurona, lambda cihalotrin, proteínas hidrolizadas, spinosad, urea + proteínas hidrolizadas.

# TABACO

## NEMATODOS Y FUSARIUM

Las parcelas afectadas por nematodos y Fusariosis vascular están distribuidas por toda la Vega del Tiétar y, en menor medida, en la Vega del Alagón. Los ataques más importantes se producen en parcelas con suelos ligeros y arenosos, cultivadas con variedades susceptibles a nematodos y/o con elevado ataque la campaña anterior.

**Cuando se empiezan a ver los síntomas en las plantas de tabaco, las soluciones posibles son poco eficaces.** Por ello, para combatir adecuadamente la siguiente campaña los nematodos y la Fusariosis asociada a ellos, **se debe empezar a actuar al finalizar ésta.**

Respecto a los nematodos de la especie *Meloidogyne* (llamados habitualmente “porrillas”), el primer paso es **valorar el ataque real existente en la parcela.** Se realizará **antes de levantar el cultivo**, mediante la **observación en campo de los daños en las raíces** para **poder tomar las decisiones adecuadas en la campaña siguiente, respecto a los tratamientos y la utilización de variedades resistentes.**



Raíz con nódulos en raíces principales debido al fuerte ataque de *Meloidogyne* sp.



Parcela gravemente afectada por *Meloidogyne* sp..

Si al extraer las **raíces** se encuentran **limpias** y sin embargo las plantas tenían síntomas de **ataque de Fusarium**, **podría deberse a** la presencia del nematodo *Globodera*, que no se ve a simple vista.



Quistes de *Globodera* vistos en lupa binocular

Para confirmar la existencia de *Globodera*, o para cualquier duda en relación con la valoración del ataque de nematodos, se puede consultar a los técnicos asesores de la explotación.

## LABORES DE OTOÑO

Es muy importante la **destrucción de los restos de cosecha mediante labores, inmediatamente después de finalizar la recolección**, para evitar que continúe el desarrollo de patógenos (insectos, nemátodos, hongos, virus,...) existentes en las plantas y que éstos puedan causar problemas la próxima campaña.

También se recomienda, lo antes posible, la siembra de un cultivo de cobertura con plantas biocidas, por los beneficios que originan en el suelo: reduce erosión, mejora fertilidad, mejora la estructura, aumenta la materia orgánica y actividad biológica y, al ser plantas biocidas, ayuda al control de patógenos del suelo.

Para la siembra de plantas biocidas se recomienda:

- Preparar bien el terreno con grada para romper la costra, deshacer los terrones grandes y eliminar malas hierbas que hayan nacido. Dejar el terreno suficientemente mullido para la implantación de las semillas. Si el terreno tiene tendencia a encharcarse con la lluvia del otoño o retener humedad se aconseja hacer pequeños caballones, o al menos elevar el terreno de la zona a sembrar porque las plantas biocidas son bastantes sensibles al encharcamiento.



- Sembrar con abonadora centrífuga o sembradora. Se puede mezclar la semilla con arena o abono para facilitar la distribución de la semilla en el suelo.
- Enterrar muy ligeramente la semilla con rulo o tabla, no más de 1cm.

**Para que un producto pueda comercializarse debe estar autorizado e inscrito necesariamente en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios.**

**Le recordamos que la información oficial y actualizada de si un producto fitosanitario está autorizado en un cultivo y contra un determinado organismo nocivo (plaga, enfermedad o mala hierba) se obtiene consultando en la página Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios:**



<http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp>

Si se desea recibir por e-mail esta publicación, deberá solicitarlo a través del siguiente correo electrónico: [buzon.fitosanitario@juntaex.es](mailto:buzon.fitosanitario@juntaex.es) y se puede ver en el siguiente enlace <https://www.juntaex.es/temas/agricultura-ganaderia/sanidad-vegetal>

EN LAS ZONAS DONDE EXISTAN ATRIAS/ATESVE SEGUIR LAS  
RECOMENDACIONES DEL TÉCNICO CORRESPONDIENTE

Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente

Ctra. San Vicente, nº 3 – Tfños: 924 011000 / 924011147  
06071 BADAJOZ

Avda. Luis Ramallo, s/n – Tfños: 924 002000  
06800 MÉRIDA